ЛАБОРАТОРНЫЕ МАРКЁРЫ ПОЛИОРГАННОЙ ПАТОЛОГИИ ПРИ ТЯЖЁЛОМ ТЕЧЕНИИ И НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ИСХОДАХ ИНФЕКЦИИ SARS-COV-2 (СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Н.А. Коньшкo¹, Л.И. Вольнец², Г.С. Коньшкo³

¹Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, Москва, Россия

²Смоленская областная клиническая больница, Смоленск, Россия

³Смоленский государственный медицинский университет, Смоленск, Россия

Laboratory markers of multiple organ pathology in severe cases and adverse outcomes of SARS-CoV-2 infection (systematic review)

N.A. Konyshko¹, L.I. Volynets², G.S. Konyshko³

¹First Moscow State Medical University named after I.M. Sechenov, Moscow, Russia

²Smolensk Regional Clinical Hospital, Smolensk, Russia

³Smolensk State Medical University, Smolensk, Russia

Резюме

Представлены современные научно обоснованные сведения о лабораторных параметрах пациентов с тяжёлым течением и неблагоприятными исходами инфекции SARS-CoV-2. Проанализированы полнотекстовые публикации клинических, рандомизированных и когортных исследований, систематические обзоры и мета-анализы из научных баз PubMed, Elsevier, Scopus, Google Scholar, E-library за период с 2019 по 2022 г. Определены конкретные биомаркеры, включая воспалительные и иммунологические параметры (C-реактивный белок, прокальцитонин, интерлейкин-6, D-димер, ферритин), гематологические (количество нейтрофилов, лимфоцитов, их соотношение, RDW), миокардиальные (тропонин, креатинкиназа, миоглобин), печеночные (АСТ, АЛТ, общий билирубин, альбумин) и характеризующие повреждение легких (гликопротеин Кребса фон ден Лунгена-6), которые могут быть использованы для стратификации риска, в качестве прогностических критериев неблагоприятного течения заболевания, в том числе полиорганной недостаточности, тяжёлого течения и летального исхода пациентов с COVID-19. В исследованиях продемонстрирована роль новых биомаркеров воспалительных и системных проявлений COVID-19: прокальцитонина, кальпротектина и пресепсина.

Ключевые слова: лабораторная диагностика, прогностические биомаркеры, тяжёлое течение COVID-19, полиорганная недостаточность.

Введение

Цель обзора — представить современные научно обоснованные сведения о лабораторных параметрах пациентов с тяжёлым течением и неблагоприятными исходами инфекции SARS-CoV-2. Проанализированы полнотекстовые публикации

Abstract

The aim of the review: to present up-to-date scientifically based information about the laboratory parameters of patients associated with severe SARS-CoV-2 infection and internal organ damage. Materials and methods: full-text publications of clinical, randomized and cohort studies, systematic reviews and meta-analyses from scientific databases PubMed, Elsevier, Scopus, Google Scholar, E-library for the period from 2019 to 2022 were analyzed. Results. Specific biomarkers were identified, including inflammatory and immunological parameters (C-reactive protein, procalcitonin, IL6), hematological (number of lymphocytes and neutrophils, NLR, D-dimer, ferritin, RDW), myocardial (troponin, creatinekinase-MB, myoglobin), hepatic (AST, ALT, total bilirubin, albumin) and characterizing lung injury (KL-6), which can be used for risk stratification, as prognostic biomarkers of adverse clinical consequences, including death in patients with COVID-19. The studies demonstrated new biomarkers of inflammatory and systemic manifestations of COVID19: procalcitonin, calprotectin and presepsin.

Key words: laboratory diagnostics, prognostic parameters, severe COVID-19, multiple organ failure.

клинических, рандомизированных и когортных исследований, систематические обзоры и мета-анализы из научных баз PubMed, Elsevier, Scopus, Google Scholar, E-library за период с 2019 по 2022 г. [1 – 107].

Инфекция SARS-CoV-2 может протекать в виде различных клинических форм от бессимптомного

носительства до заболевания тяжёлой степени, характеризующегося пневмонией, дыхательной или полиорганной недостаточностью и неблагоприятными исходами. Клинико-лабораторные параметры можно рассматривать в качестве диагностических и прогностических маркеров риска тяжелого течения, поражения внутренних органов и исходов инфекции SARS-CoV-2. В научных работах представлены лабораторные параметры с оценкой их диагностической и прогностической значимости при различных клинических вариантах течения инфекции SARS-CoV-2 (табл.) [1 – 107].

Лабораторные параметры пациентов при тяжелом течении инфекции SARS-CoV-2 с полиорганной недостаточностью

Достоверно доказана связь тяжелого течения и/или летальных исходов при COVID-19 с возрастом старше 55 лет, множественной коморбидной патологией, обширным поражением легких, гипоксией, рядом патологических лабораторных показателей и биомаркерами полиорганной патологии.

Тяжелое течение COVID-19 характеризуется лимфопенией, повышением уровня С-реактивного

Таблица

Лабораторные параметры и их статистические характеристики как неблагоприятные прогностические критерии при COVID-19 [1–107]

Лабораторные параметры	Статистические характеристики биомаркеров при неблагоприятном течении COVID-19
Лейкоциты	М 24 10 ⁹ /л; 95% ДИ 20,2 – 28,0 10 ⁹ /л
Лимфоциты	95% ДИ 0,5 – 1,5 10 ⁹ /л
Тромбоциты	95% ДИ 100 – 150 10 ⁹ /л
СОЭ	М 61,2 мм/ч; 95% ДИ 41,3 – 81,0
Гемоглобин, г/л	М 120; 95% ДИ 39 – 140
RDW	М 15,8; ССР 0,56; 95% ДИ 0,31 – 0,81
СОЭ, мм/ч	М 69; 95% ДИ 34 – 104
Фибриноген, г/л	ССР 0,587 г/л; 95% ДИ 0,445 – 0,730
Фибрин, г/л	ССР 0,725 мг/мл; 95% ДИ 0,439 – 1,010
D-димер, нг/мл	М 30,1; ССР более 0,859 мг/мл; 95% ДИ 20,4 – 39,7
С-реактивный белок, мг/л	М 73,6; ОШ 4,76; 95% ДИ 65,0 – 81,3
Интерлейкин-6, нг/л	М 3,13; 95% ДИ 0,24 – 6,03
АЛТ, ед/л	М 225; 95% ДИ 178 – 280
АСТ, ед/л	М 219; 95% ДИ 175 – 263
ЛДГ, ммоль/л	М 462; 95% ДИ 379 – 547
Кардиальный тропонин, нг/мл	ОШ 0,56; 95% ДИ 0,05 – 1,17
Высокочувствительный тропонин I, нг/мл	М 3,00; 95% ДИ 2,33 – 3,66
Миоглобин, нг/мл	М 3,00; 95% ДИ 1,36 – 7,36
NT-проBNP, нг/мл	ССР 5,59; 95% ДИ 3,00 – 8,17
Креатинкиназа-MB, ед/л	М 0,97; ССР 6,32; 95% ДИ 0,62 – 1,32
Ферритин, нг/мл	М 300; ОР 3,53; 95% ДИ 1,52 – 8,16
Альбумин, ммоль/л	М 62,9; 95% ДИ 28,3 – 91,2
Креатинин, ммоль/л	М 153; 95% ДИ 62 – 243
Кальпротектин, мкг/г	М 1,34; 95% ДИ 0,77, 1,91
Гомоцистеин, мкмоль/л	М 1,75; 95% ДИ 1,26 – 2,35
Пресепсин, пг/мл	М 2 268; 95% ДИ 1 145 – 4 305
Апотипопротеин А1, г/л	ОР 0,35; 95% ДИ 0,24 – 0,49
Аполипопротеин В, г/л	ОР 0,78; 95% ДИ 0,69 – 0,87
Гликопротеин Кребса фон ден Лунгена-6	ССР 1,86; 95% ДИ 0,9 – 2,8
Прокальцитонин, нг/мл	М 0,8; 95% ДИ 0,71 – 0,90

ССР – стандартизированные средние различия; ОШ – отношение шансов; ОР – отношение рисков; ДИ – доверительный интервал; М – медиана.

белка (СРБ), активности аспаратаминотрансферазы (АСТ) и аланинаминотрансферазы (АЛТ) [1, 2].

Инфекция SARS-CoV-2 тяжёлой степени с полиорганной недостаточностью ассоциируется с увеличением соотношения нейтрофилов к лимфоцитам, содержания лейкоцитов, нейтрофилов, СРБ, D-димера, сывороточного амилоида А, интерлейкина-6 (IL6), кардиального тропонина, с повышением активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ), АСТ, АЛТ, а также с лимфо- и тромбоцитопенией, снижением уровня гемоглобина и с удлинением протромбинового времени (ПТВ) [3–5]. Систематический обзор и мета-анализ Rostami et al. продемонстрировали, что повышенные уровни фибриногена, фибрина и D-димера при COVID-19 тяжелой степени могут быть прогностическими критериями полиорганной недостаточности и критического состояния пациентов [6].

Гематологические и иммунологические параметры могут быть использованы для прогноза неблагоприятного течения инфекции SARS-CoV-2 и патологии органов и систем, стратификации и определения тактики ведения пациентов. Баланс между эффективностью противовирусного ответа и нарушением регуляции иммунных реакций является ключевым фактором, определяющим тяжесть течения COVID-19. Уровни цитокинов, особенно интерлейкинов (IL), в сочетании с другими параметрами иммунитета, связанными с Т-лимфоцитами, могут быть использованы для прогноза степени тяжести COVID-19. Содержание интерлейкинов IL2, IL2R, IL4, IL6, IL8, IL10 и TNF α сыворотки повышено у пациентов с тяжелым течением, причем наибольшие различия наблюдались при сравнении IL6 и IL10 пациентов с тяжелым течением и одноимённых параметров наблюдаемых с заболеванием лёгкой и средней степени тяжести [7, 8].

Снижение содержания фракций комплемента С3 и С4, свидетельствующее о его активации, ассоциировано с полиорганной недостаточностью, тяжелым течением COVID-19 и летальными исходами, поэтому указанные параметры можно использовать для прогноза неблагоприятного течения заболевания [9]. Анализ иммунологических и воспалительных биомаркеров при COVID-19 продемонстрировал снижение уровня CD3+ и CD4+ Т-лимфоцитов, особенно при тяжелом и критическом течении COVID-19 у пациентов. При этом скорость оседания эритроцитов (СОЭ), СРБ и IL6 были повышены независимо от степени тяжести заболевания [10].

Научные исследования подтверждают потенциальную роль кальпротектина как важного параметра при оценке течения воспалительных заболеваний, в том числе для стратификации пациентов

по степени тяжести COVID-19. Уровень кальпротектина достоверно выше у наблюдаемых с тяжелым течением COVID-19 и с мультиорганной недостаточностью, что указывает на прогностическую значимость указанного параметра [11].

Повышенный уровень гомоцистеина рассматривается в качестве потенциального биомаркера для прогноза риска ухудшения состояния пациентов с COVID-19 [12].

Пресепсин сыворотки определен в качестве нового диагностического биомаркера сепсиса, обладающего высокой чувствительностью и специфичностью, а также как перспективный прогностический критерий тяжелого течения инфекции SARS-CoV-2 [13, 14].

Прогностические биомаркеры летального исхода у пациентов с полиорганной недостаточностью при COVID-19

Лабораторные данные пациентов с летальным исходом при COVID-19 достоверно отличаются от параметров крови выживших значительным повышением уровней кардиального тропонина, СРБ, IL6, D-димера, креатинина и АЛТ, а также снижением альбумина [4, 15]. Повышение значения соотношений фибриноген/альбумин и азот мочевины сыворотки/альбумин коррелируют с неблагоприятным клиническим прогнозом и смертностью при COVID-19 [16].

Лимфопения и повышенный уровень D-димера прямо коррелируют с риском смерти при COVID-19 [17].

Лимфопения, тромбоцитопения, увеличение количества лейкоцитов и тромбоцитов, а также повышенные уровни D-димера, СРБ, прокальцитонина, креатинина и активности креатинкиназы, АСТ, АЛТ и ЛДГ достоверно связаны с высоким уровнем смертности у пациентов с полиорганной недостаточностью на фоне тяжелого течения заболевания, с сатурацией кислородом менее 90%, госпитализацией в отделение интенсивной терапии, с использованием инвазивной искусственной вентиляции легких [18–20].

Прокальцитонин – биомаркер раннего выявления системных инфекций [21]. Содержание прокальцитонина повышается у пациентов с инфекцией SARS-CoV-2 в тяжелом и критическом состоянии [10, 18, 22, 23–25], параметр признан прогностическим критерием неблагоприятного течения и летальных исходов при COVID-19 [18, 26, 27].

Гемограмма при тяжелом течении инфекции SARS-CoV-2

Лимфопения и тромбоцитопения ассоциированы с неблагоприятным прогнозом и тяжелым течением COVID-19 [28–30]. Лимфопения и увеличение количества нейтрофилов являются маркерами

прогрессирования заболевания [31]. Значительный лейкоцитоз и нейтрофилия наблюдаются у пациентов с тяжелым течением, быстрой прогрессией, полиорганной недостаточностью и летальными исходами [32]. Тяжелое течение COVID-19 с мультиорганным поражением ассоциировано с лейкоцитозом, нейтрофилией, лимфопенией и повышенной активностью КФК и ЛДГ [33]. Соотношение нейтрофилов и лимфоцитов, пиковое соотношение тромбоцитов и лимфоцитов имеют важное значение для прогноза тяжёлого течения при инфекции SARS-CoV-2 [22]. Продемонстрировано достоверное снижение содержания лимфоцитов у пациентов с COVID-19 по сравнению с наблюдаемыми с неподтверждённым диагнозом, у наблюдаемых на поздних стадиях COVID-19 в сравнении с наблюдаемыми в начале заболевания, а также у пациентов с тяжёлым течением заболевания, при полиорганной недостаточности и летальном исходе [34]. Предполагается использование указанного параметра в качестве биомаркера неблагоприятного течения при инфекции SARS-CoV-2 [34 – 39].

Метаболизм железа играет значительную роль при синдроме полиорганной недостаточности у пациентов с COVID-19. Систематический обзор с мета-анализом [40] на основе около 57 000 наблюдений пациентов с диагнозом COVID-19 доказал более высокие уровни ферритина у умерших пациентов по сравнению с выжившими. Аналогичные данные получены и другими исследователями [22, 28, 41]. Гиперферритинемия можно рассматривать как сигнал системного воспаления и негативный прогностический критерий при COVID-19 [26].

Увеличение степени распределения эритроцитов крови по величине (RDW) достоверно ассоциировано с прогнозом неблагоприятного течения COVID-19: с тяжелой степенью заболевания, полиорганной недостаточностью и летальными исходами [42, 43]. RDW может быть использован в качестве наиболее доступного маркера для ранней стратификации пациентов с инфекцией SARS-CoV-2 [4].

Лабораторные критерии коагулопатии при COVID-19

Гиперкоагуляция крови и венозная тромбоземболия часто выявляются у наблюдаемых с COVID-19 [29]. Смертность достоверно выше у пациентов с коагулопатией, вызванной инфекцией SARS-CoV-2 [31]. Требуется детальное изучения механизма влияния аберрантного фибринолиза на клиническое ухудшение COVID-19. Нарушения параметров свертываемости крови, в частности увеличение протромбинового времени (ПТВ) и АЧТВ, повышенный уровень продуктов деградации фибрина, тяжелая тромбоцитопения

могут привести к диссеминированному внутрисудистому свертыванию крови и полиорганному повреждению при COVID-19 [29]. Повышение содержания протромбина, фибриногена, D-димера может свидетельствовать об активации свертывающей системы крови, высокой вероятности тромботических осложнений, полиорганной недостаточности, тяжёлого течения и неблагоприятного исхода заболевания [28, 29, 44 – 57]. D-димер рассматривается в качестве ключевого независимого биомаркера тяжести течения и смертности при COVID-19 [53, 55 – 57].

Исследования подтвердили, что повышение уровня ферритина, отношения нейтрофилов к лимфоцитам и RDW имеют высокую прогностическую значимость при определении степени тяжести и смертности пациентов с полиорганной патологией при COVID-19.

Биомаркеры эндотелиальной дисфункции у пациентов с инфекцией SARS-CoV-2

Эндотелиальная дисфункция – одно из ключевых звеньев в патогенезе COVID-19. Повышение уровней проадреномедулина (MR-proADM), E-селектина, эндотелиальной молекулы адгезии 1 (VCAM-1), фактора Виллебранда (VWF-Ag) и ангиопоэтина-2 (Ang-2) ассоциировано с тяжелым течением заболевания [58].

Исследование Andrianto et al. продемонстрировало повышенный уровень VWF-Ag у пациентов с COVID-19. Увеличение содержания VWF-Ag, тканевого активатора плазминогена (t-PA), ингибитора активатора плазминогена-1 (PAI-1) и растворимого тромбомодулина (sTM) связано с неблагоприятным прогнозом у пациентов с COVID-19: с тяжёлым течением и полиорганной недостаточностью [59].

Лабораторные параметры повреждения сердечно-сосудистой системы при COVID-19

Патология сердечно-сосудистой системы при COVID-19 является серьезным отягощающим фактором, создаёт риск неблагоприятного прогноза заболевания и негативно влияет на выживаемость пациентов. У значительного числа наблюдаемых с COVID-19 было выявлено острое повреждение миокарда, которое явилось одной из причин увеличения числа госпитализаций в отделение интенсивной терапии и высокой смертности [60, 61]. Long et al. [62] с помощью мета-анализа данных доказали, что риск летальных исходов госпитализированных пациентов с COVID-19 при сердечно-сосудистых заболеваниях выше, чем у в группе наблюдаемых без поражения данной системы [62, 63].

У госпитализированных пациентов с COVID-19 частота развития недостаточности кровообращения, нарушения ритма и проводимости сердца, острого повреждения миокарда и тромботических

осложнений достаточно высока и часто ассоциирована с повышением лабораторных параметров поражения сердечно-сосудистой системы [63, 64].

Биомаркеры, специфичные для повреждения миокарда, используются в качестве прогностических критериев при определении клинических исходов и тяжести COVID-19. Концентрация кардиальных и воспалительных маркеров была повышена у 95–98% пациентов с подтвержденным миокардитом вследствие инфекции COVID-19 [65]. Кардиальный тропонин и N-концевой натрийуретический пептид (NT-proBNP), а также менее специфичные маркеры (креатинкиназа-MB (СК-MB), миоглобин, IL6 и СРБ) являются прогностическими критериями для выявления на ранней стадии пациентов с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний при тяжелом течении COVID-19 [66, 67]. Иммуноопосредованное повреждение миокарда, установленное на основании высокой концентрации в сыворотке крови кардиального тропонина I, ЛДГ, миоглобина, IL6, СРБ и креатинкиназы-MB ассоциировано с тяжелым течением, полиорганной недостаточностью и летальными исходами пациентов с COVID-19 [63, 67–70]. Креатинкиназу-MB предложено использовать для определения риска неблагоприятного течения указанной патологии [67, 70–72].

У пациентов с COVID-19 увеличение количества лейкоцитов, активности АСТ и ЛДГ и уровня D-димера вследствие воспаления и коагулопатии [71] связаны со степенью тяжести COVID-19 [73, 74]. При тяжелом течении инфекции SARS-CoV-2 содержание лактатдегидрогеназы увеличено по ряду причин. Инфекционные заболевания с потенциально тяжелым течением могут приводить к цитокинопосредованному повреждению тканей, в том числе миокарда, лёгких и высвобождению ЛДГ. Исследования доказали, что лактатдегидрогеназа может быть прогностическим критерием неблагоприятных исходов [75–77] и полиорганной недостаточности [63, 68, 69, 76–80] у госпитализированных пациентов с инфекцией SARS-CoV-2.

Увеличение концентрации тропонина, выявленное примерно у 30% пациентов с COVID-19, связано с увеличением смертности при данной патологии [81]. У пациентов пожилого возраста с повышенным уровнем тропонина в сочетании с увеличением содержания АСТ сыворотки чаще наблюдались неблагоприятные исходы COVID-19 [82, 83]. Высокочувствительный тропонин I связан с тяжелым течением и летальностью при COVID-19 [84]. Тропонин и уровень натрийуретического пептида повышены примерно у 90% инфицированных SARS-CoV-2 [85]. Содержание высокочувствительного тропонина I (hsTnI) и NT-proBNP повышается в течение курса лечения только у выживших госпитализированных пациентов с COVID-19 [69].

В ходе анализа данных около 52 000 пациентов с инфекцией SARS-CoV2 выявлена связь заболевания с персистирующим/новым повреждением сердечно-сосудистой системы после выздоровления и с повышенным уровнем NT-proBNP [86]. Более высокие уровни натрийуретического пептида типа В (BNP) или NT-proBNP в плазме крови ассоциированы с тяжелым течением COVID-19 и смертностью [87, 88]. Кардиальный тропонин Т (TnT) наиболее тесно связан с тяжелым течением заболевания и летальными исходами, за ним по степени значимости следуют NT-proBNP, кардиальный тропонин I (TnI), ЛДГ, D-димер, креатинкиназа и креатинкиназа-MB [72].

Систематический обзор и мета-анализ, проведенные по материалам исследования 64 000 пациентов с COVID-19, доказали, что повышенный уровень миоглобина более распространен, чем увеличение содержания кардиального тропонина I у наблюдаемых с тяжелым течением заболевания. Авторы предположили, что повышение уровня миоглобина может служить дополнительным критерием для прогноза неблагоприятных исходов, связанных с COVID-19 [89].

Аполипопротеины, которые признаны прогностическим критерием сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний, предложены в качестве такового при инфекционных заболеваниях, в том числе при COVID-19. Пациенты с низкой концентрацией аполипопротеина А1 (ApoA1) и аполипопротеина В (ApoB) имеют более высокий риск развития тяжелого течения COVID-19 и летальных исходов, поэтому ApoA1 и ApoB могут быть использованы в качестве дополнительных потенциальных биомаркеров для прогноза степени тяжести COVID-19 [90].

Повышенные активности гидроксibuтират-дегидрогеназы, комбинированного маркера повреждения миокарда и почек, ассоциировано с тяжелым течением и смертностью при COVID-19. HBDH может быть использован как критерий неблагоприятного прогноза течения COVID-19 [91].

Биомаркеры, специфичные для повреждения сердца, в частности, сердечный тропонин и миоглобин, можно рассматривать в качестве прогностических критериев для раннего выявления высокой вероятности развития кардиомиопатии, ассоциированной с COVID-19, рисков тяжелого течения заболевания или госпитализации в отделение интенсивной терапии, наблюдения с целью своевременной коррекции терапии пациентов с COVID-19 [92, 93].

Лабораторные параметры повреждения почек при COVID-19

Ранняя оценка и мониторинг функций почек и печени необходимы для прогноза течения

COVID-19. Острое повреждение почек (ОПП) — осложнение инфекции SARS-CoV-2 с высокой вариабельностью течения и исходов.

В результате анализа влияния COVID-19 на функцию почек доказано, что распространенность ОПП при указанном заболевании составила 4% и была значительно выше у пациентов с тяжелым течением, госпитализированных в отделение интенсивной терапии и при летальном исходе [94, 95]. У пациентов с течением заболевания лёгкой и средней степени тяжести содержание мочевины сыворотки было ниже в сравнении с умершими и с пациентами с тяжелым течением SARS-CoV-2 [94]. Достоверное увеличение концентрации мочевины, креатинина и снижение альбумина, свидетельствующее о дисфункции почек, было установлено при госпитализации у умерших по сравнению с выжившими [96].

Биомаркеры патологии печени при инфекции SARS-CoV-2

Острое повреждение печени распространено у пациентов с COVID-19 и связано с тяжёлым течением заболевания и смертностью [33, 97–99]. Выявлена корреляция между тяжёлым и критическим состоянием пациентов с инфекцией SARS-CoV-2 и биохимическими параметрами повреждения гепатоцитов (повышением АСТ, АЛТ, общего билирубина и снижением содержания альбумина) [97–101]. Повышенная активность печеночных ферментов чаще встречается у мужчин, чем у женщин при тяжелом течении COVID-19 [99]. Повышение уровней АСТ, АЛТ, общего билирубина и ЛДГ и снижение содержания альбумина сильно коррелируют с летальными исходами при инфекции SARS-CoV-2 [102]. Доказано, что снижение содержания альбумина можно использовать для прогноза тяжелого течения COVID-19 [103, 104]. Биомаркеры повреждения печени (АСТ, АЛТ, билирубин и альбумин) можно отнести к прогностическими критериям для оценки поражения легких у пациентов с COVID-19.

Биомаркеры поражения бронхолёгочной системы при COVID-19

В ходе научных изысканий доказано, что основные симптомы COVID-19 — кашель (выявляется в 53% случаев), болезненность мышц (в 21%), реже встречается диарея (у 7%) [105]. Тяжесть повреждения легких связана с содержанием гликопротеина Кребса фон ден Лунгена-6 (KL-6), экспрессируемого в альвеолярном эпителии II типа. Увеличение данного параметра с умеренно высокой чувствительностью и специфичностью может свидетельствовать о тяжелом поражении легких и неблагоприятном прогнозе у пациентов с инфекцией SARS-CoV-2 [106]. Уровень сывороточного KL-6

может быть использован в качестве прогностического критерия течения данной патологии [107].

Заключение

Таким образом, большой объем полученных лабораторных данных продемонстрировал многогранность патогенетических механизмов инфекции SARS-CoV-2, её непредсказуемое течение, быструю трансформацию в тяжёлые формы с полиорганной недостаточностью и летальными исходами.

Анализ доступной научной литературы доказал клиническую значимость биомаркеров сердечно-сосудистой, бронхолёгочной и печеночной недостаточности. Данных о связи параметров поражения почек с тяжёлым течением COVID-19 на данный момент недостаточно, чтобы говорить об их достоверности.

Использование специфических лабораторных параметров возможно в качестве основных прогностических критериев COVID-19. Определены конкретные биомаркеры, включая воспалительные и иммунологические параметры (С-реактивный белок, прокальцитонин, интерлейкин 6), гематологические (количество нейтрофилов и лимфоцитов и их соотношение, D-димер, ферритин, RDW), миокардиальные (тропонин, креатинкиназа, миоглобин), печеночные (АСТ, АЛТ, общий билирубин, альбумин) и характеризующие повреждение легких (гликопротеин Кребса фон ден Лунгена-6), которые могут быть использованы для стратификации пациентов, в качестве прогностических критериев неблагоприятного течения заболевания, включая полиорганную недостаточность, тяжёлую степень заболевания и летальный исход пациентов с COVID-19. В исследованиях продемонстрированы новые биомаркеры воспалительных и системных проявлений COVID-19: прокальцитонин, кальпротектин и пресепсин. Следует продолжить аналитический поиск специфических биомаркеров, уровни которых меняются в течение инфекции SARS-CoV-2, и изучение их взаимосвязи с клиническими параметрами, что оптимизирует раннюю стратификацию пациентов, лечебно-диагностические алгоритмы и снизит вероятность неблагоприятных исходов при COVID-19.

Литература

1. Borges Do Nascimento I. J., Von Groote T. C., O'mathuna D. P., et al. Clinical, laboratory and radiological characteristics and outcomes of novel coronavirus (SARS-Cov-2) infection in humans: A systematic review and series of meta-analyses. *PLoS One* 2020;15, E0239235. doi:10.1371/journal.pone.0239235
2. Zhang Z. L., Hou Y. L., Li D. T., Li F. Z. Laboratory findings of COVID-19: A systematic review and meta-analysis. *Scand. J. Clin. Lab. Invest.* 2020;80, 441–447. doi:10.1080/00365513.2020.1768587

3. Alnor A., Sandberg M. B., Gils C., Vinholt P. J. Laboratory tests and outcome for patients with coronavirus disease 2019: A systematic review and meta-analysis. *J. Appl. Lab. Med.* 2020;5, 1038 – 1049. doi:10.1093/jalm/jfaa098
4. Elshazli R. M., Toraih E. A., Elgaml A., et al. Diagnostic and prognostic value of hematological and immunological markers in COVID-19 infection: A meta-analysis of 6320 patients. *PLoS One.* 2020;15, E0238160. doi:10.1371/journal.pone.0238160
5. Kermali M., Khalsa R. K., Pillai K., et al. The role of biomarkers in diagnosis of COVID-19 – a systematic review. *Life Sci.* 2020;254, 117788. doi:10.1016/j.lfs.2020.117788
6. Rostami M., Khoshnegah Z., Mansouritorghabeh H. Hemostatic system (Fibrinogen level, d-dimer, and FDP) in severe and non-severe patients with COVID-19: A systematic review and meta-analysis. *Clin. Appl. Thromb. Hemost.* 2021;27, 10760296211010973. doi:10.1177/10760296211010973
7. Liu Y., Cai J., Wang C., Jin J., Qu L. A systematic review and meta-analysis of incidence, prognosis, and laboratory indicators of venous thromboembolism in hospitalized patients with coronavirus disease 2019. *J. Vasc. Surg. Venous Lymphat Disord.* 2021;9, 1099 – 1111. doi:10.1016/j.jvs.2021.01.012
8. Jafri S., Aziz M. A., Islam M. S. Elevated levels of pleiotropic interleukin-6 (IL-6) and interleukin-10 (IL-10) are critically involved with the severity and mortality of COVID-19: An updated longitudinal meta-analysis and systematic review on 147 studies. *Biomark. Insights.* 2022;17, 11772719221106600. doi:10.37766/inplasy2022.4.0046
9. Zinellu A., Mangoni A. A. Serum complement C3 and C4 and COVID-19 severity and mortality: A systematic review and meta-analysis with meta-regression. *Front. Immunol.* 2021;12, 696085. doi:10.3389/fimmu.2021.696085
10. Iwamura A. P. D., Tavares Da Silva M. R., Hummelgen A. L., et al. Immunity and inflammatory biomarkers in COVID-19: A systematic review. *Rev. Med. Virol.* 2021;31, E2199. doi:10.1002/rmv.2199
11. Udeh R., Advani S., De Guadiana Romualdo L. G., Dolja-Gore X. Calprotectin, an emerging biomarker of interest in COVID-19: A systematic review and meta-analysis. *J. Clin. Med.* 2021;10. doi:10.3390/jcm10040775
12. Carpena G., Negrini D., Henry B. M., et al. Homocysteine in coronavirus disease (COVID-19): A systematic literature review. *Diagnosis (Berl).* 2022;9, 306 – 310. doi:10.1515/dx-2022-0042
13. Zou Q., Wen W., Zhang X. C. Presepsin as a novel sepsis biomarker. *World J. Emerg. Med.* 2014;5, 16 – 19. doi:10.5847/wjem.j.issn.1920-8642.2014.01.002
14. Ahmed S., Mansoor M., Shaikh M. S., Siddiqui I. Presepsin as a predictive biomarker of severity in COVID-19: A systematic review. *Indian J. Crit. Care Med.* 2021;25, 1051 – 1054. doi:10.5005/jp-journals-10071-23967
15. Tian W., Jiang W., Yao J., et al. Predictors of mortality in hospitalized COVID-19 patients: A systematic review and meta-analysis. *J. Med. Virol.* 2020;92, 1875 – 1883. doi:10.1002/jmv.26050
16. Ulloque-Badaracco J. R., Hernandez-Bustamante E. A., Herrera-Anazco P., Benites-Zapata V. A. Prognostic value of apolipoproteins in COVID-19 patients: A systematic review and meta-analysis. *Travel Med. Infect. Dis.* 2021;44, 102200. doi:10.1016/j.tmaid.2021.102200
17. Figliozzi S., Masci P. G., Ahmadi N., et al. Predictors of adverse prognosis in COVID-19: A systematic review and meta-analysis. *Eur. J. Clin. Invest.* 2020;50, E13362. doi:10.1111/eci.13362
18. Malik P., Patel U., Mehta D., et al. Biomarkers and outcomes of COVID-19 hospitalisations: Systematic review and meta-analysis. *BMJ Evid Based Med.* 2021;26, 107 – 108. doi:10.1136/bmjebm-2020-111536
19. Shi C., Wang L., Ye J., et al. Predictors of mortality in patients with coronavirus disease 2019: A systematic review and meta-analysis. *BMC Infect. Dis.* 2021;21, 663. doi:10.1186/s12879-021-06369-0
20. Xiang G., Xie L., Chen Z., et al. Clinical risk factors for mortality of hospitalized patients with COVID-19: Systematic review and meta-analysis. *Ann. Palliat Med.* 2021;10, 2723 – 2735. doi:10.21037/apm-20-1278
21. Wacker C., Prkno A., Brunkhorst F. M., Schlattmann P. Procalcitonin as a diagnostic marker for sepsis: A systematic review and meta-analysis. *Lancet Infect. Dis.* 2013;13, 426 – 435. doi:10.1016/S1473-3099(12)70323-7
22. Huang I., Pranata R. Lymphopenia in severe coronavirus disease-2019 (COVID-19): Systematic review and meta-analysis. *J. Intensive Care.* 2020;8, 36. doi:10.1186/s40560-020-00453-4
23. Hariyanto T. I., Japar K. V., Kwenandar F., et al. Inflammatory and hematologic markers as predictors of severe outcomes in COVID-19 infection: A systematic review and meta-analysis. *Am. J. Emerg. Med.* 2021;41, 110 – 119. doi:10.1016/j.ajem.2020.12.076
24. Zheng Z., Peng F., Xu B., et al. Risk factors of critical and mortal COVID-19 cases: A systematic literature review and meta-analysis. *J. Infect.* 2020;81, E16 – E25. doi:10.1016/j.jinf.2020.04.021
25. Ahmed S., Jafri L., Hoodbhoy Z., Siddiqui I. Prognostic value of serum procalcitonin in COVID-19 patients: A systematic review. *Indian J. Crit. Care Med.* 2021;25, 77 – 84. doi:10.5005/jp-journals-10071-23706
26. Melo A. K. G., Milby K. M., Caparroz A., et al. Biomarkers of cytokine storm as redflags for severe and fatal COVID-19 cases: A living systematic review and meta-analysis. *PLoS One* 2021;16, E0253894. doi:10.1371/journal.pone.0253894
27. Zare M. E., Wang Y., Nasir Kanestani A., et al. Procalcitonin has good accuracy for prognosis of critical condition and mortality in COVID-19: A diagnostic test accuracy systematic review and meta-analysis. *Iran J. Allergy Asthma Immunol.* 2020;19, 557 – 569. doi:10.18502/ijaai.v19i6.4926
28. Huang I., Pranata R., Lim M. A., et al. C-reactive protein, procalcitonin, d-dimer, and ferritin in severe coronavirus disease-2019: A meta-analysis. *Ther. Adv. Respir. Dis.* 2020;14, 1753466620937175. doi:10.1177/1753466620937175
29. Terpos E., Ntanasis-Stathopoulos I., Elalamy I., et al. Hematological findings and complications of COVID-19. *Am. J. Hematol.* 2020;95, 834 – 847. doi:10.1002/ajh.25829
30. Pranata R., Lim M. A., Yonas E., et al. Thrombocytopenia as a prognostic marker in COVID-19 patients: Diagnostic test accuracy meta-analysis. *Epidemiol. Infect.* 2021;149, E40. doi:10.1017/S0950268821000236
31. Lim A. Y. H., Goh J. L., Chua M. C. W., et al. Temporal changes of haematological and radiological findings of the COVID-19 infection—a review of literature. *BMC Pulm Med.* 2021;21, 37. doi:10.1186/s12890-020-01389-z
32. Chua P. E. Y., Shah S. U., Gui H., et al. Epidemiological and clinical characteristics of non-severe and severe pediatric and adult COVID-19 patients across different geographical regions in the early phase of pandemic: A systematic review and meta-analysis of observational studies. *J. Investig. Med.* 2021;69, 1287 – 1296. doi:10.1136/jim-2021-001858
33. Kovalic A. J., Huang G., Thuluvath P. J., Satapathy S. K. Elevated liver biochemistries in hospitalized Chinese patients with severe COVID-19: Systematic review and meta-analysis. *Hepatology* 2021;73, 1521 – 1530. doi:10.1002/hep.31472
34. Alkhatip A., Kamel M. G., Hamza M. K., et al. The diagnostic and prognostic role of neutrophil-to-lymphocyte ratio in COVID-19: A systematic review and meta-analysis. *Expert Rev. Mol. Diagn.* 2021;21, 505 – 514. doi:10.1080/14737159.2021.1915773

35. Li X., Liu C., Mao Z., et al. Predictive values of neutrophil-To-Lymphocyte ratio on disease severity and mortality in COVID-19 patients: A systematic review and meta-analysis. *Crit. Care*.2020;24, 647. doi:10.1186/s13054-020-03374-8
36. Simadibrata D. M., Calvin J., Wijaya A. D., Ibrahim, N. A. A. Neutrophil-To-Lymphocyte ratio on admission to predict the severity and mortality of COVID-19 patients: A meta-analysis. *Am. J. Emerg. Med.* 2021;42, 60–69. doi:10.1016/j.ajem.2021.01.006
37. Sarkar P. G., Pant P., Kumar J., Kumar A. Does neutrophil-ToLymphocyte ratio At admission predict severity and mortality in COVID-19 patients? a systematic review and meta-analysis. *Indian J. Crit. Care Med.* 2022;26,361–375. doi:10.5005/jp-journals-10071-24135
38. Sarkar S., Khanna P., Singh A. K. The impact of neutrophil lymphocyte count ratio in COVID-19: A systematic review and meta-analysis. *J. Intensive Care Med.* 2022;37, 857–869. doi:10.1177/08850666211045626
39. Parthasarathi A., Padukudru S., Arunachal S., et al. The role of neutrophil-To-Lymphocyte ratio in risk stratification and prognostication of COVID-19: A systematic review and metaanalysis. *Vaccines (Basel)* 2022;10. doi:10.3390/vaccines10081233
40. Taneri P. E., Gomez-Ochoa S. A., Llanaj E., et al. Anemia and iron metabolism in COVID-19: A systematic review and meta-analysis. *Eur. J. Epidemiol.* 2020;35, 763–773. doi:10.1007/s10654-020-00678-5
41. Kaushal K., Kaur H., Sarma P., et al. Serum ferritin as a predictive biomarker in COVID-19. a systematic review, meta-analysis and meta-regression analysis. *J. Crit. Care*2022;67, 172–181. doi: 10.1016/j.jcrc.2021.09.023
42. Zinellu A., Mangoni A. A. Red blood cell distribution width, disease severity, and mortality in hospitalized patients with SARS-Cov-2 infection: A systematic review and meta-analysis. *J. Clin. Med.* 2021;10(2),286. doi:10.3390/jcm10020286
43. Lee J. J., Montazerin S. M., Jamil A., et al. Association between red blood cell distribution width and mortality and severity among patients with COVID-19: A systematic review and metaanalysis. *J. Med. Virol.* 2021;93, 2513–2522. doi:10.1002/jmv.26797
44. Rostami M., Mansouritorghabeh H. D-dimer level in COVID-19 infection: A systematic review. *Expert Rev. Hematol.* 2020;13,1265–1275. doi:10.1080/17474086.2020.1831383
45. Zhang X., Yang X., Jiao H., Liu X. Coagulopathy in patients with COVID-19: A systematic review and meta-analysis. *Aging (Albany NY)*. 2020;12, 24535–24551. doi:10.18632/aging.104138
46. Xiang G., Hao S., Fu C., et al. The effect of coagulation factors in 2019 novel coronavirus patients: A systematic review and meta-analysis. *Med. (Baltimore)* 2021;100, E24537. doi:10.1097/MD.00000000000024537
47. Liu Y., Cai J., Wang C., Jin J., Qu, L. (b). A systematic review and meta-analysis of incidence, prognosis, and laboratory indicators of venous thromboembolism in hospitalized patients with coronavirus disease 2019. *J. Vasc. Surg. Venous Lymphat Disord.*2021;9, 1099–1111. E6. doi: 10.1016/j.jvsv.2021.01.012
48. Woller S. C., De Wit K., Robert-Ebadi H., et al. A systematic review of biomarkers among hospitalized patients with COVID-19 predictive of venous thromboembolism: A communication from the predictive and diagnostic variables scientific and standardization committee of the ISTH. *Res. Pract. Thromb. Haemost.* 2022;6, E12786. doi:10.1002/rth2.12786
49. Duz M. E., Balci A., Menekse E. (). D-dimer levels and COVID-19 severity: Systematic review and meta-analysis. *Tuber Toraks* 2020;68, 353–360. doi:10.5578/tt.70351; Simadibrata D. M., Lubis A. M. D-dimer levels on admission and all-cause mortality risk in COVID-19 patients: A meta-analysis. *Epidemiol. Infect.* 2020;148, E202. doi:10.1017/S0950268820002022
50. Sakka M., Connors J.M., Hekimian G., et al. Association between d-dimer levels and mortality in patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19): A systematic review and pooled analysis. *J. Med. Vasc.*2020;45, 268–274. doi:10.1016/j.jdmv.2020.05.003
51. Lima W. G., Barra A., Brito J. C. M., Nizer W. S. C. (). D-dimer serum levels as a biomarker associated for the lethality in patients with coronavirus disease 2019: A meta-analysis. *Blood Coagul Fibrinolysis* 2020;31, 335–338. doi: 10.1097/MBC.0000000000000927
52. Paliogiannis P., Mangoni A. A., Dettori P., et al. D-dimer concentrations and COVID-19 severity: A systematic review and meta-analysis. *Front. Public Health* 2020;8, 432. doi: 10.3389/fpubh.2020.00432
53. Ji H. J., Su Z., Zhao R., et al. Insufficient hyperfibrinolysis in COVID-19: A systematic review of thrombolysisbased on meta-analysis and meta-regression. *Medrxiv.* 2020;1–25. doi: 10.1101/2020.09.07.20190165; Varikasuvu S. R., Varshney S., Dutt N., et al. D-dimer, disease severity, and deaths (3D-study) in patients with COVID-19: A systematic review and meta-analysis of 100 studies. *Sci. Rep.* 2021;11, 21888. doi:10.1038/s41598-021-01462-5
54. Nugroho J., Wardhana A., Maghfirah I., et al. Relationship of d-dimer with severity and mortality in SARS-Cov-2 patients: A meta-analysis. *Int. J. Lab. Hematol.* 2021;43, 110–115. doi:10.1111/ijlh.13336; Chua P. E. Y., Shah S. U., Gui H., et al. Epidemiological and clinical characteristics of non-severe and severe pediatric and adult COVID-19 patients across different geographical regions in the early phase of pandemic: A systematic review and meta-analysis of observational studies. *J. Investig. Med.* 2021;69, 1287–1296. doi:10.1136/jim-2021-001858
55. Varikasuvu S. R., Varshney S., Dutt N., et al. D-dimer, disease severity, and deaths (3D-study) in patients with COVID-19: A systematic review and meta-analysis of 100 studies. *Sci. Rep.* 2021;11, 21888. doi:10.1038/s41598-021-01462-5
56. Zhao R., Su Z., Komissarov A. A., et al. Associations of d-dimer on admission and clinical features of COVID-19 patients: A systematic review, meta-analysis, and meta-regression. *Front. Immunol.* 2021;12, 691249. doi:10.3389/fimmu.2021.691249
57. Hariyanto T. I., Japar K. V., Kwenandar F., et al. Inflammatory and hematologic markers as predictors of severe outcomes in COVID-19 infection: A systematic review and meta-analysis. *Am. J. Emerg. Med.* 2021;41, 110–119. doi:10.1016/j.ajem.2020.12.076
58. Lampsas S., Tsaplaris P., Pantelidis P., et al. The role of endothelial related circulating biomarkers in COVID-19. a systematic review and meta-analysis. *Curr. Med. Chem.* 2021.29(21), 3790–3805. doi:10.2174/0929867328666211026124033
59. Andrianto Al-Farabi M. J., Nugraha R. A., et al. Biomarkers of endothelial dysfunction and outcomes in coronavirus disease 2019 (COVID-19) patients: A systematic review and meta-analysis. *Microvasc Res.* 2021.138, 104224. doi:10.1016/j.mvr.2021.104224
60. Momtazmanesh S., Shobeiri P., Hanaei S., et al. Cardiovascular disease in COVID-19: A systematic review and meta-analysis of 10,898 patients and proposal of a triage risk stratification tool. *Egypt Heart J.* 2020;72, 41. doi:10.1186/s43044-020-00075-z
61. Vakhshoori M., Emami S. A., Heidarpour M., et al. Corona virus disease 2019 (COVID-19) and its effect on renal system, a systematic review and meta-analysis. *Iran J. Kidney Dis.* 2020;14, 419–438
62. Long J., Luo Y., Wei Y. The effect of cardiovascular disease and acute cardiac injury on fatal COVID-19: A meta-analysis. *Am. J. Emerg. Med.* 2021;48, 128–139. doi:10.1016/j.ajem.2021.04.013

63. Shoar S., Hosseini F., Naderan M., Mehta J. L. Meta-analysis of cardiovascular events and related biomarkers comparing survivors versus nonsurvivors in patients with COVID-19. *Am. J. Cardiol.* 2020;135, 50 – 61. doi:10.1016/j.amjcard.2020.08.044
64. Pellicori P., Doolub G., Wong C. M., et al. COVID-19 and its cardiovascular effects: A systematic review of prevalence studies. *Cochrane Database Syst. Rev.* 2021;3, CD013879. doi: 10.1002/14651858.CD013879
65. Jaiswal V., Sarfraz Z., Sarfraz A., et al. COVID-19 infection and myocarditis: A state-of-the-art systematic review. *J. Prim Care Community Health.* 2021;12, 21501327211056800. doi:10.1177/21501327211056800
66. Shafi A. M. A., Shaikh S. A., Shirke M. M., et al. Cardiac manifestations in COVID-19 patients—a systematic review. *J. Card Surg.* 2020;35, 1988 – 2008. doi:10.1111/jocs.14808;
67. Alzahrani S. H., Al-Rabia M. W. Cardiac injury biomarkers and the risk of death in patients with COVID-19: A systematic review and meta-analysis. *Cardiol. Res. Pract.* 2021, 9363569. doi:10.1155/2021/9363569
68. Parohan M., Yaghoubi S., Seraji A. Cardiac injury is associated with severe outcome and death in patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19) infection: A systematic review and meta-analysis of observational studies. *Eur. Heart J. Acute Cardiovasc. Care.* 2020;9, 665 – 677. doi:10.1177/2048872620937165
69. Li J. W., Han T. W., Woodward M., et al. The impact of 2019 novel coronavirus on heart injury: A systematic review and meta-analysis. *Prog. Cardiovasc. Dis.* 2020;63, 518 – 524. doi: 10.1016/j.pcad.2020.04.008; Walker C., Deb S., Ling H., Wang Z. Assessing the elevation of cardiac biomarkers and the severity of COVID-19 infection: A meta-analysis. *J. Pharm. Pharm. Sci.* 2020;23, 396 – 405. doi:10.18433/jpps31501;
70. An W., Kang J. S., Wang Q., Kim, T. E. Cardiac biomarkers and COVID-19: A systematic review and meta-analysis. *J. Infect. Public Health* 2021;14, 1191 – 1197. doi:10.1016/j.jiph.2021.07.016
71. Zinellu A., Sotgia S., Fois A. G., Mangoni A. A. Serum CK-MB, COVID-19 severity and mortality: An updated systematic review and meta-analysis with meta-regression. *Adv. Med. Sci.* 2021;66, 304 – 314. doi: 10.1016/j.advms.2021.07.001
72. Qiang Z., Wang B., Garrett B. C., et al. Coronavirus disease 2019: A comprehensive review and meta-analysis on cardiovascular biomarkers. *Curr. Opin. Cardiol.* 2021;36, 367 – 373. doi: 10.1097/HCO.0000000000000851
73. Paliogiannis P., Mangoni A. A., Dettori P., et al. D-dimer concentrations and COVID-19 severity: A systematic review and meta-analysis. *Front. Public Health.* 2020;8, 432. doi: 10.3389/fpubh.2020.00432
74. Zheng Z., Peng F., Xu B., et al. Risk factors of critical & mortal COVID-19 cases: A systematic literature review and meta-analysis. *J. Infect.* 2020;81, E16 – E25. doi:10.1016/j.jinf.2020.04.021
75. Martinez-Outschoorn U. E., Prisco M., Ertel A., et al. Ketones and lactate increase cancer cell “Stemness,” driving recurrence, metastasis and poor clinical outcome in breast cancer: Achieving personalized medicine Viametabolo-genomics. *Cell Cycle.* 2011;10, 1271 – 1286. doi:10.4161/cc.10.8.15330
76. Erez A., Shental O., Tchebiner J. Z., et al. Diagnostic and prognostic value of very high serum lactate dehydrogenase in admitted medical patients. *Isr. Med. Assoc. J.* 2014;16, 439 – 443
77. Assiri A., Al-Tawfiq J. A., Al-Rabeeh A. A., et al. Epidemiological, demographic, and clinical characteristics of 47 cases of middle East respiratory syndrome coronavirus disease from Saudi Arabia: A descriptive study. *Lancet Infect. Dis.* 2013;13, 752 – 761. doi:10.1016/S1473-3099(13)70204-4.
78. Alnor A., Sandberg M. B., Gils C., Vinholt P. J. Laboratory tests and outcome for patients with coronavirus disease 2019: A systematic review and meta-analysis. *J. Appl. Lab. Med.* 2020;5, 1038 – 1049. doi:10.1093/jalm/jfaa098
79. Kermali M., Khalsa R. K., Pillai K., et al. The role of biomarkers in diagnosis of COVID-19 – a systematic review. *Life Sci.* 2020;254, 117788. doi:10.1016/j.lfs.2020.117788
80. Zhang Z. L., Hou Y. L., Li D. T., Li F. Z. Laboratory findings of COVID-19: A systematic review and meta-analysis. *Scand. J. Clin. Lab. Invest.* 2020;80, 441 – 447. doi:10.1080/00365513.2020.1768587
81. Wibowo A., Pranata R., Akbar M. R., et al. Prognostic performance of troponin in COVID-19: A diagnostic meta-analysis and meta-regression. *Int. J. Infect. Dis.* 2021;105, 312 – 318. doi: 10.1016/j.ijid.2021.02.113
82. Toraih E.A., Elshazli R.M., Hussein M.H., et al. Association of cardiac biomarkers and comorbidities with increased mortality, severity, and cardiac injury in COVID-19 patients: A meta-regression and decision tree analysis. *J. Med. Virol.* 2020;92, 2473 – 2488. doi:10.1002/jmv.26166
83. Vakhshoori M., Heidarpour M., Shafie D., et al. Acute cardiac injury in COVID-19: A systematic review and meta-analysis. *Arch. Iran Med.* 2020;23, 801 – 812. doi:10.34172/aim.2020.107
84. Chaudhary R., Garg J., Houghton D.E., et al. Thrombo-inflammatory biomarkers in COVID-19: Systematic review and meta-analysis of 17,052 patients. *Mayo Clin. Proc. Innov. Qual. Outcomes.* 2021;5, 388 – 402. doi:10.1016/j.mayocpiqo.2021.01.009
85. Rathore S. S., Rojas G. A., Sondhi M., et al. Myocarditis associated with covid-19 disease: A systematic review of published case reports and case series. *Int. J. Clin. Pract.* 2021;75, E14470. doi:10.1111/ijcp.14470
86. Ramadan M. S., Bertolino L., Zampino R., et al. Hospital Cardiovascular Infection Study, G. Cardiac sequelae after coronavirus disease 2019 recovery: A systematic review. *Clin. Microbiol. Infect.* 2021;27, 1250 – 1261. doi:10.1016/j.cmi.2021.06.015
87. Zinellu, A., Mangoni, A. A. Serum complement C3 and C4 and COVID-19 severity and mortality: A systematic review and meta-analysis with meta-regression. *Front. Immunol.* 2021;12, 696085. doi:10.3389/fimmu.2021.696085
88. Pranata R., Huang I., Lukito, A. A., Raharjo S. B. Elevated nterminal pro-brain natriuretic peptide is associated with increased mortality in patients with COVID-19: Systematic review and meta-analysis. *Postgrad Med. J.* 2020.96, 387 – 391. doi:10.1136/postgradmedj-2020-137884
89. Ma C., Tu D., Gu J., et al. The predictive value of myoglobin for COVID-19-Related adverse outcomes: A systematic review and meta-analysis. *Front. Cardiovasc. Med.* 2021;8, 757799. doi:10.3389/fcvm.2021.757799
90. Ulloque-Badaracco J. R., Hernandez-Bustamante E. A., Herrera-Anazco P., Benites-Zapata V. A. Prognostic value of apolipoproteins in COVID-19 patients: A systematic review and meta-analysis. *Travel Med. Infect. Dis.* 2021;44, 102200. doi:10.1016/j.tmaid.2021.102200
91. Zinellu, A., Paliogiannis, P., Carru, C., Mangoni, A. A. Serum hydroxybutyrate dehydrogenase and COVID-19 severity and mortality: A systematic review and meta-analysis with meta-regression. *Clin. Exp. Med.* 2021. doi:10.1007/s10238-021-00777-x
92. An W., Kang J. S., Wang Q., Kim T. E. Cardiac biomarkers and COVID-19: A systematic review and meta-analysis. *J. Infect. Public Health.* 2021;14, 1191 – 1197. doi:10.1016/j.jiph.2021.07.016
93. Dy L. F., Lintao R. C. V., Cordero C. P., et al. Prevalence and prognostic associations of cardiac abnormalities among hospitalized patients with COVID-19: A systematic review and meta-analysis. *Sci. Rep.* 2021;11, 8449. doi:10.1038/s41598-021-87961-x

94. Vakhshoori M., Emami S. A., Heidarpour M., et al. Corona virus disease 2019 (COVID-19) and its effect on renal system, a systematic review and meta-analysis. *Iran J. Kidney Dis.* 2020;14, 419–438
95. Lim M. A., Pranata R., Huang I., et al. Multiorgan failure with emphasis on acute kidney injury and severity of COVID-19: Systematic review and meta-analysis. *Can. J. Kidney Health Dis.* 2020;7, 2054358120938573. doi:10.1177/2054358120938573
96. Tian W., Jiang W., Yao J., et al. Predictors of mortality in hospitalized COVID-19 patients: A systematic review and meta-analysis. *J. Med. Virol.* 2020;92, 1875–1883. doi:10.1002/jmv.26050
97. Ahmed J., Rizwan T., Malik F., et al. Covid-19 and liver injury: A systematic review and meta-analysis. *Cureus*2020;12,E9424. doi:10.7759/cureus.9424
98. Abdulla S., Hussain A., Azim D., et al. Covid-19-Induced hepatic injury: A systematic review and metaanalysis. *Cureus*.2020;12, E10923. doi:10.7759/cureus.10923
99. Shokri Afra H., Amiri-Dashatan N., Ghorbani F., et al. Positive association between severity of COVID-19 infection and liver damage: A systematic review and meta-analysis. *Gastroenterol. Hepatol. Bed Bench.*2020;13, 292–304
100. Aziz M., Haghbin H., Lee-Smith W. Gastrointestinal predictors of severe COVID-19: Systematic review and meta-analysis. *Ann. Gastroentero.*2020;l.33, 615–630. doi:10.20524/aog.2020.0527
101. Zarifian A., Zamiri Bidary M., Arekhi S., et al. Gastrointestinal and hepatic abnormalities in patients with confirmed COVID-19: A systematic review and meta-analysis. *J. Med. Virol.* 2021;93, 336–350. doi:10.1002/jmv.26314
102. Ye L., Chen B., Wang Y., et al. Prognostic value of liver biochemical parameters for COVID-19 mortality. *Ann. Hepatol.* 2021;21, 100279. doi:10.1016/j.aohep.2020.10.007
103. Aziz M., Fatima R., Lee-Smith W., Assaly R. The association of low serum albumin level with severe COVID-19: A systematic review and metaanalysis. *Crit. Care.*2020;24, 255. doi:10.1186/s13054-020-02995-3
104. Hariyanto T. I., Japar K. V., Kwenandar F., et al. Inflammatory and hematologic markers as predictors of severe outcomes in COVID-19 infection: A systematic review and meta-analysis. *Am. J. Emerg. Med.* 2021;41, 110–119. doi:10.1016/j.ajem.2020.12.076
105. Wan S., Li M., Ye Z., et al. CT manifestations and clinical characteristics of 1115 patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19): A systematic review and meta-analysis. *Acad. Radiol.* 2020.27, 910–921. doi:10.1016/j.acra.2020.04.033
106. Pramana Witarto A., Samarta Witarto B., Er Putra A. J., et al. Serum Krebs Von den lungen-6 for predicting the severity of COVID-19 lung injury: A systematic review and meta-analysis. *Iran BioMed. J.*2021.25, 381–389. doi:10.52547/ibj.25.6.381
107. Naderi, N., Rahimzadeh, M. Krebs Von Den lungen-6 (KL-6) as a clinical marker for severe COVID-19: A systematic review and meta-analyses. *Virology.*2022.566, 106–113. doi:10.1016/j.virol.2021.11.006

Авторский коллектив:

Коньшко Наталья Александровна — доцент кафедры общей врачебной практики ИПО Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова, д.м.н.; тел.: +7-951-694-60-64, e-mail: Nkonyshko@yandex.ru

Волынец Лариса Исаковна — главный врач Смоленской областной клинической больницы, к.м.н.; тел.: 8(4812) 55-40-76, e-mail: smolokb@yandex.ru,

Коньшко Григорий Сергеевич — студент 2 курса стоматологического факультета Смоленского государственного медицинского университета; тел.: +7-951-694-73-41, e-mail: Nkonyshko@yandex.ru