ИНТЕРЛЕЙКИНЫ КАК ОДИН ИЗ ВОЗМОЖНЫХ МАРКЕРОВ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ

Т.А. Кирсанова

Харьковский национальный медицинский университет, Харьков, Украина

Interleukins as one of possible markers for early diagnosis of viral hepatitis c at first year old children

T.A. Kirsanova

Khar'kov National Medical University, Khar'kov, Ukraine

Резюме. В работе представлены результаты исследования по разработке одного из возможных путей усовершенствования ранней диагностики вирусного гепатита С у детей первого года жизни, рожденных от матерей с хроническим вирусным гепатитом С, в крови которых обнаружены anti-HCV IgG, на основе изучения содержания интерлейкинов сыворотки крови в динамике наблюдения за детьми. Доказано, что у детей с материнскими антителами к вирусу гепатита С отмечается постепенное снижение титра anti-HCV IgG на фоне физиологического содержания интерлейкинов или уровень их не превышает норматив в 1,5–2 раза. У детей с собственными антителами anti-HCV IgG появлению РНК вируса в крови и синтезу anti-HCV IgM предшествует повышение уровня интерлейкинов, особенно ИЛ-6. Реакция интерлейкинов сыворотки крови может послужить одним из важных критериев определения принадлежности антител к вирусу гепатита С и более раннего познания на вирусный гепатит С у детей первого года жизни. Среди всех интерлейкинов наиболее специфическим ранним маркером развития вирусного гепатита С может быть ИЛ-6. В качестве одного из возможных методов уточнения принадлежности антител и более раннего познания о наличии у ребенка диагноза вирусного гепатита С у детей первого года жизни, рожденных от матерей с хроническим вирусным гепатитом С и в крови которых были обнаружены антитела anti-HCV IgG, может быть использован тщательный мониторинг титра антител класса IgM, IgG, ПЦР и уровня интерлейкинов в сыворотке крови (особенно ИЛ-6).

Ключевые слова: дети первого года жизни, вирусный гепатит С, интерлейкины, материнские антитела, собственные антитела, диагностика.

Введение

Вирусный гепатит С (ВГС) у детей имеет большую социальную значимость среди всех вирусных гепатитов с парентеральным путем передачи ввиду его повсеместной распространенности и неблагоприятных последствий [1, 2]. Заболеваемость ВГС среди детей составляет 2,5 на 100 000 детского населения, а носительство вирусов составляет 9,4 на 100 000 [1, 3, 4]. Дети первого года жизни занима-

Abstract. The article presents the results of the research of improvement one of possible methods of early diagnostics of viral hepatitis C at first-year old children, who born from mothers with chronic viral hepatitis C, in blood anti-HCV IgG are revealed, based on the study of maintenance of blood serum interleukins in dynamic observation of children. Proven that for children with maternal antibodies to virus of hepatitis C gradual decrease of titer of anti-HCV IgG is marked on background of physiological maintenance of interleukins or their level doesn't exceed the normal in 1,5-2 time. For children with own antibodies of anti-HCV IgG a few months prior to viral RNA and synthesis of anti-HCV IgM in blood is observed increase of level of interleukins, especially IL-6. At children with their own anti-HCV IgG antibodies for few months before the synthesis of anti-HCV IgM are increased levels of interleukins, particularly IL-6. Thus, the serum interleukins response is an important criterion in determining the conditioning of antibodies to virus hepatitis C and earlier diagnosis of viral hepatitis C for first-year old children. Among all interleukins the most specific early marker of viral hepatitis C is IL-6. To clarify the belonging antibodies and more early diagnostics viral hepatitis C to all first-year old children, who born from mothers with chronic viral hepatitis C, and whose blood had reduced antibodies of anti-HCV IgG, it is recommended the more careful monitoring of titer of antibodies of class IgM, IgG, PCR and level of interleukins in serum (especially IL-6).

Key words: the children of the first year of life, viral hepatitis C, interleukins, maternal antibodies, own antibodies, diagnostic.

ют особую группу среди больных, поскольку у них могут реализовываться антенатальный и перинатальный пути передачи вирусов. По данным литературы, в этиологической структуре вирусных гепатитов среди детей раннего возраста ВГС занимает ведущее место — 41,5%, в 80% случаев он имеет перинатальное происхождение, в 5% — антенатальное, в 15% — постнатальное [5–8]. Диагностика ВГС имеет много трудностей, особенно у детей первого

года жизни, рожденных от матерей, больных ВГС, поскольку нельзя исключить, что антитела являются материнскими, а вирус — транзиторной [9]. На сегодняшний день основанием для верификации перинатального инфицирования ВГС служат выявление РНК вируса гепатита С, стойкое повышение концентрации anti-HCV IgG core и NS 3-5, повышение активности цитолитических ферментов более двух норм, характерные изменения количественных критериев эхоскопии печени [10, 11]. Однако остаются невыясненными временные рамки и уровень IgG, позволяющие установить принадлежность антител к материнскому организму или организму ребенка [12].

Цель исследования — усовершенствование ранней диагностики вирусного гепатита С у детей первого года жизни, рожденных от матерей с хроническим гепатитом С.

Материалы и методы

Под наблюдением находилось 55 детей первого года жизни, из них 35 детей, в сыворотке крови которых в возрасте 1 — 3 месяцев жизни были обнаружены anti-HCV Ig G, и 20 здоровых детей, составивших контрольную группу. Кроме общепринятых клинических и лабораторно-инструментальных методов исследования (клинический анализ крови и мочи, функциональные пробы печени, протеинограмма, коагулограмма, ПЦР сыворотки крови, УЗИ органов брюшной полости и др.), всем детям проводили ежемесячный мониторинг антител anti-HCV IgG и anti-HCV IgM (с помощью иммуноферментного анализа), определения интерлейкинов (ИЛ)-1 β , -4, -6, интерферона (ИФН) γ (с помощью твердофазного иммуноферментного метода) в сыворотке крови.

Результаты и обсуждение

Нами было обследовано 35 детей первого года жизни, в сыворотке крови которых в возрасте 1 — 3 месяцев жизни были обнаружены anti-HCV Ig G, при этом активность АлАТ в крови была в пределах физиологической. Также нами были обследованы матери, у всех из них в крови также обнаружены anti-HCV IgG, а у 9 (25,7%) — в том числе и anti-HCV IgM. Исходные титры антител представлены в таблице 1.

Таблица 1

Исходные титры антител anti-HCV Ig G у детей и их матерей

Титр антител (ед. опт. пл.)	Количество детей		Количество матерей	
	n	%	n	%
0,8 — 1,0	9	25,7	5	14,3
1,1 — 1,5	6	17,1	8	22,9
1,6 — 2,0	11	31,4	12	34,3
2,1 — 2,5	7	20,0	6	17,1
2,6 и более	2	5,7	4	11,4

У 9 детей (25,7%) титр антител колебался в пределах 0,8 — 1,0 ед. опт. пл., 6 (17,1%) — 1,1 — 1,5; 11 (31,4%) — 1,6 — 2,0; 7 (20,0%) — 2,1 — 2,5; 2 (5,7%) — более 2,6. У 5 матерей (14,3%) титр антител колебался в пределах 0,8 — 1,0; 8 (22,9%) — 1,1 — 1,5; 12 (34,3%) — 1,6 — 2,0; 6 (17,1%) — 2,1 — 2,5; 4 (11,4%) — более 2,6.

Мы проанализировали титры антител класса IgG детей и их матерей и выяснили, что у 9 детей (25,7%) титр антител изначально был ниже, чем материнский, принадлежность антител была расценена как материнская, диагноз ВГС был снят. У 26 пациентов (74,3%) титр антител был выше, чем материнский, поэтому с целью уточнения принадлежности антител за ними проводилось последующее наблюдение. По результатам проведенного динамического наблюдения в последующем всех детей мы разделили на четыре группы в зависимости от динамики титра антител anti-HCV Ig G и/или anti-HCV Ig M.

В первую группу вошло 14 детей (53,8%), у которых до 6 — 9 месяцев жизни титр антител anti-HCV Ig G постепенно снижался и становился ниже материнского, уровень всех исследуемых ИЛ у них не превышал показатели здоровых детей, ПЦР сыворотки крови в течение наблюдения не выявляла наличие РНК вируса гепатита С, что позволяло расценить антитела anti-HCV IgG как материнские и снять диагноз ВГС (рис. 1, 2).

У 9 пациентов (25,7%) в динамике наблюдения в течение одного года титр anti-HCV IgG оставался на одном уровне (вторая — четвертая группы наблюдения). Во второй группе было 7 детей (77,8%), у которых уровень всех ИЛ несколько повышался, но не превышал показатели здоровых детей более чем в 1,5 — 2 раза, к концу первого года количественное содержание ИЛ снижалось до физиологических показателей, в течение всего периода наблюдения в крови детей отсутствовали anti-HCV IgM, по результатам ПЦР в крови отсутствовала РНК вируса гепатита С, это позволяло расценить антитела anti-HCV IgG как материнские и снять диагноз ВГС (рис. 3, 4).

У 2 детей титр (третья группа наблюдения) антител оставался на одном уровне, содержание всех ИЛ постепенно нарастало, уровень ИЛ-1, ИЛ-4 и ИФН превышал показатели здоровых детей в 3 — 4 раза, ИЛ-6 — в 6 — 8 раз, при этом к концу первого года в крови таких детей были обнаружены anti-HCV IgM, методом ПЦР в сыворотке крови выявлялась РНК вируса, что свидетельствовало о синтезе собственных антител и наличии у них ВГС (рис. 5, 6). При этом нами было отмечено, что появлению в крови anti-HCV IgM и РНК возбудителя предшествовало повышение содержания интерлейкинов сыворотки крови.

Рис. 1. Динамика титра антител у детей первой группы наблюдения

Рис. 2. Содержание ИЛ (пг/мл) сыворотки крови детей первой группы наблюдения

Рис. 3. Динамика титра антител у детей второй группы наблюдения

Рис. 4. Содержание ИЛ (пг/мл) сыворотки крови детей второй группы

Рис. 5. Динамика титра антител детей третьей группы наблюдения

Рис. 6. Содержание ИЛ (пг/мл) сыворотки крови детей третьей группы

У 3 детей (8,6%) четвертой группы наблюдения титр anti-HCV IgG и количественное содержание ИЛ в динамике наблюдения повышались, при этом уровень ИЛ-6 почти сразу превышал показатели здоровых детей более чем в 4 раза, через 3–4 месяца в крови детей были обнаружены anti-HCV IgM и отмечалось выделение РНК вируса гепатита С в сыворотке крови, что свидетельствовало об имеющемся у них ВГС (рис. 7, 8). Также отмечено, что повышение уровня ИЛ предшествовало выявлению anti-HCV IgM и отмечалось выделение РНК возбудителя.

Рис. 7. Динамика титра антител детей четвертой группы наблюдения

Рис. 8. Содержание ИЛ (пг/мл) сыворотки крови детей четвертой группы

Мы проанализировали коэффициенты корреляции титров антител anti-HCV IgG сыворотки крови детей и содержания интерлейкинов и обнаружили, что между титром антител и содержанием ИЛ-4 и ИФН γ существует прямая слабая связь, между

титром антител и содержанием ИЛ-1 β — прямая средняя связь, а между титром антител и содержанием ИЛ-6 — прямая сильная связь (табл. 2).

Таблица 2

Коэффициенты корреляции между титром антител и уровнем интерлейкинов

Интерлейкины	Коэффициент корреляции	Вероятность
ИЛ-1 β	+0,311	$p \leq 0,03$
ИЛ-4	+0,289	$p \leq 0,05$
ИЛ-6	+0,718	$p \leq 0,001$
ИФН γ	+0,274	$p \leq 0,05$

Таким образом, среди цитокинов, исследованных нами, наибольшую информативность в качестве возможного показателя ранней диагностики вирусного гепатита С у детей представляет собой ИЛ-6.

Выводы

1. У детей с материнскими антителами к вирусу гепатита С отмечается постепенное снижение титра anti-HCV IgG на фоне физиологического содержания интерлейкинов или уровень их не превышает норматив в 1,5–2 раза.

2. У детей с собственными антителами anti-HCV IgG за несколько месяцев до синтеза anti-HCV IgM и наличия РНК вируса гепатита С в сыворотке крови наблюдается повышение уровня интерлейкинов, особенно ИЛ-6.

3. Реакция интерлейкинов сыворотки крови может служить важным критерием определения принадлежности антител к вирусу гепатита С и более раннего установления диагноза вирусного гепатита С у детей первого года жизни.

4. Среди всех исследованных нами интерлейкинов наиболее специфическим ранним маркером развития вирусного гепатита С может служить ИЛ-6.

5. В качестве одного из возможных методов уточнения принадлежности антител и более раннего подозрения о наличии у ребенка диагноза вирусного гепатита С у детей первого года жизни, рожденных от матерей с хроническим вирусным гепатитом С, и в крови которых были обнаружены антитела anti-HCV IgG, может быть использован тщательный мониторинг титра антител класса IgM, IgG, ПЦР и уровня интерлейкинов в сыворотке крови (особенно ИЛ-6).

Литература

1. Brown, R.M. Infectious diseases of the hepatobiliary system / R.M. Brown, S.G. Hübscher // Diagnostic Histopathology. — 2013. — № 3 (19). — P. 80–88.
2. Каганов, Б.С. Детская гепатология / Б.С. Каганов [и др.]. — М.: Династия, 2009. — 575 с.

3. Mandell, G.L. Principles and Practice of Infectious Diseases / G.L. Mandell, J.E. Bennett, R. Dolin. — Elsevier Ltd, 2010. — P. 2157–2185.
4. Kelly, D.A. Liver and biliary disease in childhood What's new? / D.A. Kelly // *Medicine*. — 2011. — № 10 (39). — P. 571–575.
5. Голобородько, Н.В. Врожденный гепатит С: особенности вертикальной передачи, клинических проявлений и исходов : дис. ... канд. мед. наук / Н.В. Голобородько. — Минск, 2006. — 183 с.
6. McMenamin, M.B. Obstetric management of hepatitis C-positive mothers: analysis of vertical transmission in 559 mother-infant pairs / M.B. McMenamin [et al.] // *American Journal of Obstetrics and Gynecology*. — 2008. — № 3 (199). — P. 210–221.
7. Latifa, T.F. Mother-to-infant transmission of hepatitis C virus. Concise Review / T.F. Latifa, M.K. Susan, E.A. Roberts // *Hepatology*. — № 2 (34). — 2001. — P. 223–229.
8. Московская, И.А. Организация специализированной помощи беременным с целью предупреждения перинатальной передачи вирусов гепатитов В и С / И.А. Московская [и др.] // *Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии*. — № 6. — 2007. — С. 66–74.
9. Анохин, В.А. Вирусные гепатиты в структуре перинатальных инфекций / В.А. Анохин, А.А. Гумерова // *Российский педиатрический журнал*. — № 2. — 2002. — С. 32–34.
10. Голобородько, Н.В. Роль врожденной инфекции в патологии печени / Н.В. Голобородько // *Здравоохранение*. — 2004. — № 12. — С. 24–29.
11. Орехов, К.В. Внутриутробные инфекции и патология новорожденных / К.В. Орехов [и др.]. — М.: Медпрактика, 2002. — 204 с.
12. Świątek, B.J. Is interleukin-10 gene polymorphism a predictive marker in HCV infection? / B.J. Świątek // *Cytokine and Growth Factor Reviews*. — 2012. — № 1–2 (23). — P. 47–59.

Автор:

Кирсанова Татьяна Александровна — сотрудник кафедры детских инфекционных болезней Харьковского национального медицинского университета, тел.: +38 (067) 99-99-149, e-mail — tanya_kirs@mail.ru