

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПАРВОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ РОССИИ

А.Ю. Антипова¹, И.Н. Лаврентьева¹, М.А. Бичурина¹, Л.В. Лялина¹, Ф.Р. Кутуева²

¹ ФБУН «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Пастера». Санкт-Петербург

² СПб ГУЗ «Женская консультация № 22», Санкт-Петербург

Parvovirus B19 infection prevails in North-West Russia

A.Y. Antipova¹, I.N. Lavrentieva¹, M.A. Bitchourina¹, L.V. Lialina¹, F.R. Koutoueva²

¹ Saint-Petersburg Pasteur Institute of Epidemiology and Microbiology, Saint-Petersburg

² Saint-Petersburg Maternity welfare clinic № 22, Saint-Petersburg

Резюме. В статье представлены результаты изучения распространения парвовирусной инфекции (инфекционной эритемы) на территории Северо-Западного федерального округа. Показано, что в 2009–2011 гг. антитела класса IgM к парвовирусу В 19 (PV B19) определялись в сыворотках крови больных экзантемными заболеваниями в среднем в 12,5 % случаев на 9 из 11 территорий округа. Распространение инфекционной эритемы изучали также в группе риска — среди беременных женщин Санкт-Петербурга и Вологды по наличию в сыворотках крови IgG-антител. Установлено, что в каждой возрастной группе имеются лица, перенесшие ранее парвовирусную инфекцию. Их удельный вес колеблется от 37,5 % до 83,3 %. Вместе с тем установлено, что существенная доля женщин наиболее активного репродуктивного возраста (18–35 лет) не защищена против парвовирусной инфекции: 49,2 % и 40,5 % в г. Санкт-Петербурге и г. Вологде, соответственно. Обсуждается вероятность ошибок клинической диагностики парвовирусной инфекции; подчеркивается важность вирусологического надзора за экзантемными вирусными инфекциями на современном этапе.

Ключевые слова: парвовирус В19, распространенность парвовирусной инфекции, надзор, лабораторная диагностика.

Abstract. The aim of this study is to estimate parvovirus B19 (PV B19) infection (infectious erythema) prevalence in North-West Russia. In 2009–2011 anti-IgM antibodies against PV B19 among 12,5 % of patients with exanthematous disease was detected in 9 (from 11) administrative territories of N-W region. Prevalence of anti-IgG antibodies in pregnant females (risk group) vary from 37,5 to 83,3 % in various age groups. Sufficient that most reproductively active females age group (18–35 yo) belongs to the group of risk: 49,2 % (in St-Petersburg) and 40,5 % (in Vologda) were anti-IgG PV B19 negative.

Rational clinical laboratory diagnostics and modern surveillance of PV B19 and other exanthematous diseases were discussed.

Key words: parvovirus B19, prevalence of parvovirus infection, surveillance, laboratory diagnostics

Введение

Возбудитель парвовирусной инфекции был выделен в 1975 г. Cossart [1] в плазме крови здоровых доноров и получил своё название по номеру лунки с образцом. Парвовирус человека относится к семейству *Parvoviridae* рода *Parvovirus*, обладает безоболочечным капсидом с заключённой внутри одноцепочечной ДНК [2]. Парвовирус В19 (PV B19) широко распространён в мире [3]. Наиболее значимой является его способность размножаться в эмбриональных тканях (печени, селезёнке, а также клетках сердца и кишечника плода). При заражении беременной женщины PV B19 риск поражения плода составляет 30%. Тератогенное дей-

ствие вируса особенно выражено в период 10–28 недель гестации. PV B19 вызывает гибель плода или глубокую инвалидизацию новорожденных: гидроцефалию, гепатоспленомегалию, серповидную анемию, отставание в развитии и др. [4, 5].

Заболевание, вызываемое парвовирусом В19, носит несколько общеупотребительных наименований: парвовирусная инфекция, инфекционная эритема, «пятая болезнь». Симптомы достаточно подробно описаны разными авторами [2, 6, 7]. У детей в большинстве случаев заболевание протекает как лёгкое, без осложнений. При развитии инфекции в 50% случаев наблюдается макуло-папулезная сыпь, субфебрильная температура [8]. У взрослых,

особенно женщин, в 60% случаев наблюдаются артриты и артралгии.

Проведенные исследования [6, 9] показали, что парвовирусная инфекция имеет эпидемиологические и клинические признаки, сходные с краснухой: воздушно-капельный путь передачи; развитие вспышек в закрытых коллективах; зимне-весенняя сезонность; 3–4-летний эпидемический цикл; наличие бессимптомных форм. При обеих инфекциях заболеваемость определяют лица в возрасте до 15 лет.

Необходимость лабораторного подтверждения каждого случая экзантемного заболевания существенно возросла в период, последовавший за реализацией Национального проекта в области здравоохранения. После проведения в стране массовой иммунизации против краснухи детей и селективной иммунизации взрослых (2006 – 2007 гг.) наряду с резким снижением заболеваемости краснухой, увеличилось число случаев ошибочной первичной диагностики краснушной инфекции.

Так, по данным Санкт-Петербургского регионального центра (СПбРЦ) по надзору за корью и краснухой в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), в 2008 г. клинический диагноз «краснуха» был подтвержден только в 25,5%, а в 2009 г. — в 5% случаев [10].

«Пятая болезнь», в числе других экзантемных заболеваний, может обуславливать диагностические ошибки краснухи. В настоящее время в Российской Федерации диагноз «парвовирусная инфекция», «инфекционная эритема», как правило, не ставится. Кроме того, до настоящего времени в стране проводились единичные исследования и по изучению масштабов распространения этой инфекции, ее значимости в структуре заболеваемости экзантемными вирусными инфекциями [9].

Цель исследования — определение превалентности парвовирусной инфекции на территории СЗФО РФ, в том числе в группах риска.

Материалы и методы

Были исследованы 702 сыворотки крови от больных с экзантемными заболеваниями на наличие IgM — антител к вирусам кори и краснухе. Из них 335 сывороток, отрицательных на корь и краснуху, были исследованы на наличие IgM-антител к PV B19 человека. Исследование проведено в период 2009 – 2011 гг.

IgG-антитела к PV B19 определяли в сыворотках крови 99 беременных женщин г. Санкт-Петербурга и 85 беременных женщин г. Вологда. Все исследованные сыворотки крови получены на основе информированного согласия пациентов.

До проведения исследования сыворотки крови хранились при температуре – 20° С.

В работе использованы следующие коммерческие тест-системы: «ИФА-Краснуха-IgM-capture» (ООО «ЭКОлаб-Центр», Россия), «ВектоКорь IgM» (ЗАО «Вектор-Бест», Россия), «recomWELL Parvovirus B19 IgM» и «recomWELL Parvovirus B19 IgG» (MICROGEN GmbH, Германия), которые применялись в соответствии с инструкциями.

Статистическая обработка материалов выполнена с помощью общепринятых методов [11].

Результаты и обсуждение

Исследование проводилось на базе СПбРЦ по надзору за корью и краснухой в СЗФО и отдела вирусологии ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

Критериями отбора сывороток крови от больных с экзантемными заболеваниями с целью надзора за корью и краснухой являются: наличие пятнисто-папулезной сыпи и температуры тела 37,5° С и выше [12].

В среднем на территориях СЗФО PV B19 в качестве этиологического фактора заболевания был выявлен в 12,5% случаев (табл. 1).

Установлено, что частота выявления лиц с наличием IgM-антител к PV B19 на разных территориях не одинакова. Наиболее часто инфекционная эритема лабораторно выявлялась в Калининградской области (39,4%). На двух территориях округа: Новгородской области и НАО среди пациентов с экзантемными заболеваниями не обнаружено лиц с IgM-антителами к PV B19. Вологодская область характеризовалась самым низким процентом положительных находок (2,9%). В Санкт-Петербурге лица с IgM-антителами к PV B19 обнаружены в 9,9 % случаев среди больных с экзантемами, а в Ленинградской области этот показатель выше — 13,8%.

Важно отметить, что парвовирусная инфекция лабораторно подтверждалась достоверно чаще, чем корь и краснуха ($p < 0,05$) (табл. 2).

Анализ «первичных» диагнозов показал, что в преобладающем количестве случаев (16 случаев, или 20,5%) IgM-антитела к PV B19 были обнаружены у больных с клиническим диагнозом «краснуха», в том числе в одном случае был поставлен экзотический диагноз «коровая краснуха». В 11,8% случаев IgM-антитела к PV B19 определялись у больных с неинфекционными дерматитами различной природы (клинический диагноз: «аллергическая сыпь», «аллергодерматит»). Диагноз «парвовирусная инфекция/ инфекционная эритема» был поставлен только четырём больным и подтвердился лабораторно в трех случаях. Кроме того, IgM-антитела к PV B19 определяли у больных с клиническим диагнозом «корь?» (1 случай), «ОРВИ» (1 случай), «иерсиниоз» (1 случай), «экзантема вирусной природы» (2 случая). В сыворот-

Таблица 1

Выявление IgM -антител к PV B19 в сыворотках крови больных с экзантемными заболеваниями на территориях СЗФО (2009–2011 гг.)

Год Область		2009		2010		2011 (8 мес.)		Всего	
		всего исследовано сывороток	из них IgM+ к PV B19	всего исследовано сывороток	из них IgM+ к PV B19	всего исследовано сывороток	из них IgM+ к PV B19	абс. число исследованных сывороток	из них IgM+ к PV B19 абс.
Респ. Карелия		4	0	4	1	1	0	9	1
Респ. Коми		6	0	16	2	3	0	25	2
Архангельская область		6	0	12	0	12	4	30	4
Вологодская область		7	0	18	1	9	0	34	1
Калининградская область		10	2	17	7	6	4	33	13
Ленинградская область		12	1	27	7	19	0	58	8
Мурманская область		1	1	9	0	4	0	14	1
Новгородская область		1	0	5	0	4	0	10	0
Псковская область		3	0	3	0	3	1	9	1
Санкт-Петербург		25	1	55	6	31	4	111	11
Ненецкий автономный округ (НАО)		0	0	1	0	1	0	2	0
Итого	Абс. число	75	5	167	24	93	13	335	42
	% M ± m	6,7 ± 2,9		14,4 ± 2,7		13,9 ± 3,6		12,5 ± 1,8	

ках крови больных с клинически установленным токсикоаллергическим состоянием IgM-антител к PV B19 не выявлено.

Таблица 2

Частота лабораторного подтверждения кори, краснухи и парвовирусной инфекции среди больных с экзантемными заболеваниями (2009–2011 гг.)

Лабораторно подтверждённый диагноз	Общее число обследованных	Из них с наличием IgM- антител к NV B19	
		абс. число	% M ± m
Парвовирусная инфекция	335	42	12,5±1,8
Краснуха	702	25	3,6±0,7
Корь	702	13	1,9±0,5

Распределение больных с наличием IgM-антител к PV B19 по полу и возрасту показало, что число заболевших женщин возрастной группы 15 лет и старше в 2 раза выше, чем число заболевших мужчин той же возрастной группы.

Учитывая выраженное тератогенное действие патогена, представлялось важным определить чувствительность к парвовирусу B19 беременных женщин, составляющих группу риска. При отсутствии специфической профилактики наличие IgG-антител к парвовирусу B19 указывает на перенесённое ранее заболевание и наличие защиты от инфекции.

На присутствие IgG-антител к PV B19 тестировали 184 сыворотки крови беременных женщин. Результаты сгруппированы по трем возрастным группам: 18 – 25, 26 – 35 и 36 – 45 лет и представлены в табл. 3.

Таблица 3

Определение IgG-антител к PVB19 в сыворотках крови беременных женщин

Возраст, лет	Город	Количество исследованных сывороток крови	Из них IgG + к PV B19
			абс. число
18 – 25	С.-Петербург	24	9
	Вологда	43	20
26 – 35	С.-Петербург	41	24
	Вологда	36	27
36 – 45	С.-Петербург	34	14
	Вологда	6	5
Итого	С.-Петербург	99	47
	Вологда	85	52

В Санкт-Петербурге в возрастной группе от 18 до 25 лет только 9 из 24, то есть 37,5% обследованных женщин, имели иммунитет к парвовирусу B19. В возрастной группе 26 – 35 лет этот показатель возрастал до 58,5%. Незначительное уменьшение количества серопозитивных лиц в старшей возрастной группе связано с естественным ослаблением иммунитета спустя десятилетия после инфицирования.

В Вологде в возрастной группе 18–25 лет IgG-антитела к PVB19 выявлены у 20 из 43 (47,6%) обследованных женщин, к 35-ти годам этот показатель возрос до 75,0 %.

Полученные результаты являются предварительными, но свидетельствуют о широком распространении парвовирусной инфекции. Учитывая, что наличие IgM-антител в сыворотке крови является показателем острой инфекции, можно констатировать, что в период 2009–2011 гг. парвовирусная инфекция выявлена лабораторно на 9 из 11 территорий СЗФО. По нашим данным, доля больных инфекционной эритемой в регионе за три года наблюдений составила 12,5 %. Однако можно предположить, что критерий отбора лиц с экзантемными заболеваниями, подлежащих исследованию на корь, не вполне адекватен для выявления лиц, инфицированных парвовирусом B19, учитывая большое количество бессимптомных и стертых форм заболевания, а также преобладание больных с субфебрильной (ниже 37,5 °C) температурой.

Следует также отметить, что, несмотря на широкую распространенность, парвовирусная инфекция до настоящего времени достаточно редко распознается практическими врачами. Подтверждением тому являются, в частности, полученные нами ранее результаты расследования вспышки экзантемного заболевания в одном из военных училищ СЗФО в 2009 г., когда клинический диагноз «краснуха» был заменен на лабораторно подтвержденный «парвовирусная инфекция» [13].

В преобладающем количестве случаев (16 случаев, или 20,5%) парвовирусная инфекция обнаруживалась у больных с клиническим диагнозом «краснуха». Заболевание выявлялось также при подозрении на корь, ОРВИ, иерсиниоз, экзантему вирусной природы. Эти результаты корреспондируются с данными ННМЦ по надзору за корью и краснухой: при лабораторном обследовании больных с экзантемами в г. Москве IgM-антитела к PV B19 определяли у лиц со следующими первичными диагнозами: «краснуха», «корь», «аллергический дерматит», «токсико-аллергическое состояние» [9].

Распространение парвовирусной инфекции можно оценить и по уровню коллективного иммунитета. Группу риска, помимо людей с заболеваниями крови, составляют женщины репродуктивного возраста [14]. В связи с этим популяционный иммунитет к парвовирусу B19 изучали у беременных женщин, проживающих в г. Вологде и г. Санкт-Петербурге, в возрасте от 18 до 45 лет, вне зависимости от срока гестации.

В каждой возрастной группе выявлены как серопозитивные, так и серонегативные к PV B19 лица. При этом в г. Вологде в каждой возрастной категории количество лиц, переболевших ранее

инфекционной эритемой, было выше, чем в г. Санкт-Петербурге. Ограниченный контингент лиц, обследованных на IgG-антитела к PV B19 в рамках данной работы, не позволяет делать какие-либо выводы об особенностях эпидемического процесса парвовирусной инфекции в городах с разной численностью населения. Этот вопрос требует дальнейшего изучения.

Обращает на себя внимание тот факт, что существенная доля женщин наиболее активного репродуктивного возраста (18–35 лет) не защищена против PV B19: 49,2% и 40,5% в г. Санкт-Петербурге и г. Вологде соответственно. При этом установлено, что число заболевших женщин возрастной группы 15 лет и старше в 2 раза выше числа заболевших мужчин той же возрастной группы, что можно объяснить более тесным контактом женщин с заболевшими детьми в семьях, организованных коллективах в дошкольных и школьных учреждениях.

Выводы

1. Парвовирусная инфекция характеризуется неярко выраженными, общими для многих экзантемных заболеваний симптомами, что обуславливает ошибки в диагностике заболевания.

2. Широкое распространение, принадлежность к группе TORCH-инфекций, большое количество чувствительных к инфекции лиц среди женщин репродуктивного возраста — эти обстоятельства диктуют необходимость определения алгоритма лабораторной диагностики заболевания с целью осуществления эпидемиологического надзора, а в последующем — разработки методов контроля парвовирусной инфекции.

3. Лабораторное обследование пациентов с экзантемными заболеваниями является важной задачей вирусологического надзора на этапе элиминации кори и спорадической заболеваемости краснухой.

Авторы выражают благодарность зам. главного врача по перинатологии и педиатрии ФГУ «Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова» д.м.н. Комличенко Э.В. и зам. главного врача СПб ГУЗ «Женская консультация № 22» Николаевой А. Е. за содействие в выполнении настоящего исследования.

Литература

1. Cossart, Y.E. Parvovirus-like particles in human sera / Y.E. Cossart, A.M. Field, B. Cant, D. Widdows // *Lancet*. — 1975. — P. 72–73.
2. Heegaard, E.D. Human Parvovirus B19 / E.D. Heegaard, K.E. Brown // *Clinical Microbiology Reviews*. — 2002. — P. 485–505.
3. Hübschen, J.M. Phylogenetic analysis of human parvovirus B19 sequences from eleven different countries confirms the predominance of genotype 1 and suggest the spread of genotype 3b / J.M. Hübschen, Z. Mihneva, A.F. Mentis, F. Schneider, Y. Aboudy, et al. // *Journal of Clinical Microbiology*. — 2009. — Vol. 47, № 11. — P. 3735–3738.

4. Chan, P.K.S. Parvovirus B19 associated hydrops foetalis: the first confirmed case in Hong Kong / P.K.S. Chan, K.F. To, S.K. Yip, J.S.L. Tam, A.F.B. Cheng // HKMJ. — 1998. — № 4 (3). — P. 321-323.
5. Schwarz, T.F. Detection of parvovirus B19 in fetal autopsies / T.F. Schwarz, A. Nerlich, P. Hillemanns // Archives of gynecology and obstetrics. — 1993. — Vol. 253, №. 4. — P. 207—213.
6. Матвеев, В.А. Клинико-лабораторная характеристика B19 парвовирусной инфекции / В.А. Матвеев, Н.В. Прощаева, Е.О. Самойлович, М.А. Ермолович // Инфекционные болезни. — 2008. — Т. 6, № 3. — С. 33—37.
7. Young, N.S. Mechanisms of disease Parvovirus B19 / N.S. Young, K.E. Brown // The new England Journal of Medicine. — 2004. — V. 350, № 6. — P. 586—597. www.nejm.org.
8. Харден, Э. Диагностика и лечение инфекции, вызываемой парвовирусом B19 / Э. Харден // Лечащий врач. — 2000. — №3. — С. 14—18.
9. Тихонова, Н.Т. Оценка распространения парвовирусной инфекции в Москве / Н.Т. Тихонова, А.Г. Герасимова, Т.Н. Москалёва, О.В. Цвиркун, О.О. Чава, и др. // Информационное письмо (№11). — М.: Департамент здравоохранения Правительства Москвы, 2004. — 11с.
10. Лаврентьева, И.Н. Эпидемиологический и вирусологический надзор за краснухой в условиях sporadic заболеваемости/ И.Н. Лаврентьева, Л.В. Лялина, М.А. Бичурина, А.Ю. Антипова, Н.А. Смирнова // Достижения науки и практики в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия Вооружённых сил Российской Федерации: труды Третьего съезда военных врачей медико-профилактического профиля Вооружённых сил Российской Федерации (Санкт-Петербург, 8—10 декабря 2010 г.). — СПб., 2010. — С. 87.
11. Гланц, С. Медико-биологическая статистика / С. Гланц. — М.: Практика, 1999. — 499 с.
12. Приказ № 33 от 5 февраля 2010г. Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Минздравсоцразвития РФ «Об обследовании больных с экзантемой и лихорадкой в рамках реализации программы ликвидации кори». — М.: 2010. — 8 с.
13. Бичурина, М.А. Проблемы диагностики краснухи на современном этапе / М.А. Бичурина, И.Я. Каплун, Т.Н. Москалёва, И.В. Крылова, А.Ю. Антипова, В.А. Качнов // Проблемы современной эпидемиологии. Перспективные средства и методы лабораторной диагностики и профилактики актуальных инфекций: труды Всероссийской научной конференции 19—20 ноября 2009 года. — СПб.: «Литография», 2009. — С. 99—100.
14. Bhattarakosol, P. Prevalence of parvovirus B19 infection in Thai young adults/ P. Bhattarakosol, Ch. Pancharoen, E. Kowitdamrong, R. Thammaborvorn and V. Mungmec // Southeast Asian J. Trop Med Public Health. — 2003. — Vol. 34, № 3. — P. 585—588.

Авторский коллектив:

Антипова Анастасия Юрьевна — младший научный сотрудник лаборатории детских вирусных инфекций ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера сл. тел./факс: (812) 232 94 11 e-mail: anti130403@mail.ru;

Лаврентьева Ирина Николаевна — д.м.н., зав. лабораторией детских вирусных инфекций ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера pasteur.lawr@mail.ru (812) 232-94-11;

Бичурина Маина Александровна — д.м.н., зав. лабораторией этиологии и контроля вирусов ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера poliospb@nr3854.spb.edu (812) 233-21-58;

Лялина Людмила Владимировна — д.м.н., зав. лабораторией эпидемиологии ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера lialina@119942.spb.edu (812) 233-44-70;

Кутуева Флора Рафхатовна — главный врач СПб ГУЗ «Женская консультация № 22» (812) 296-31-08.